



Introdução ao HIV/ SIDA

Objectivos de Aprendizagem



-
- Descrever a situação do HIV/SIDA no mundo em geral e em particular na África Sub-Sahariana.
 - Conhecer a prevalência do HIV/SIDA no País.

Estimativas de Adultos e Crianças Vivendo com HIV, 2007




Total: 33 milhões (30 – 36 milhões)

Prevalência Mediana do HIV entre Mulheres (15-49 anos) Atendidas em Consultas Pré-natais em Países da ÁFRICA SUB- SAHARIANA, 1998-2006



(Fonte: Vários Inquéritos em Consultas Pré-natais)





Situação do HIV/SIDA em Moçambique



Introdução

- A prevalência do HIV/SIDA em Moçambique estimada em adultos(15-49 anos) é 11,5%:
 - Mulheres: 13,1%
 - Homens: 9,2%
- Em crianças :
 - 0-11 anos: 1,4%
 - 0-11 meses: 2,3%

Estimativas de Prevalência do HIV: INSIDA – Rondas de Vigilância Epidemiológica:




-
- A estimativa de prevalência encontrada no INSIDA (11,5%) é mais baixa relativamente à estimativa de 15% obtida através da Ronda de Vigilância Epidemiológica do HIV e Sífilis no ano anterior (RVE 2009).
 - A Prevalência estimada pelo INSIDA não significa uma redução na prevalência em Moçambique, mas que a metodologia usada para estimar o número de pessoas infectadas pelo HIV melhorou.

Estimativas de Prevalência Provincial de HIV nas Rondas de Vigilância Epidemiológica de 2002, 2004 e 2007



- Prevalência do HIV em Mulheres Grávidas




Fonte: Ronda de Vigilância Epidemiológica 2007 em mulheres grávidas, Moçambique. Estimativas provinciais baseadas no EPP.

Taxas Estimadas de Prevalência do HIV em Adultos por Província, INSIDA 2009



Província	Taxa de Prevalência (mulheres-homens)		
		Região	Taxa de Prevalência (urbana-rural)
Maputo Cidade	16,8% (20,5% - 12,3%)	Sul	17,8% (17,2% - 18,6,2%)
Maputo Província	19,8% (20,0% - 19,5%)		
Gaza	25,1% (29,9% - 16,8%)		
Inhambane	8,6% (10,0% - 5,8%)		
Zambezia	12,6% (15,3% - 8,9 %)	Centro	12,5% (19,7% - 10,3%)
Sofala	15,5% (17,8% - 12,6%)		
Manica	15,3% (15,6% - 14,8%)		
Tete	7,0% (8,0% - 5,7%)		
Niassa	3,7% (3,3% - 4,3%)	Norte	5,6% (9,9% - 4,0%)
Nampula	4,6% (5,5% - 3,3%)		
Cabo Delgado	9,4% (9,5% - 9,2%)		
Nacional	Inquérito Nacional de Prevalência, Riscos Comportamentais e Informação sobre o HIV e Sida em Moçambique. INSIDA 2009		11,5% (15,9% - 9,2%)

Distribuição da Prevalência do HIV/SIDA por Sexo, INSIDA 2009, Moçambique



Impacto do HIV em Moçambique



- Sobrevivência infantil reduzida
- Sobrevivência geral reduzida
- Unidades Sanitárias sobrecarregadas (cerca de 370 mil pessoas necessitam de TARV)
- 382 mil órfãos maternos dos 0-17 anos devido ao SIDA
- 92 mil mortes por ano
- 160 mil novas infecções por ano
- Perda de trabalhadores (em geral) e trabalhadores de saúde: 15% nos últimos 10 anos (estimativa)
- Estigma, discriminação
- Aumento da prevalência/incidência de outras infecções ligadas ao HIV (tuberculose, malária)



Considerações

- A epidemia de HIV é um problema de saúde pública no mundo, na África Sub-Sahariana e em particular, em Moçambique
- O HIV apresenta alta prevalência na África Sub-Sahariana e em Moçambique
- O impacto da epidemia em Moçambique é muito grande e os Agentes de Medicina e Enfermeiros devem ser capazes de transmitir estas informações às suas comunidades.