

ESTADIO I	ESTADIO II	ESTADIO III	ESTADIO IV
- Assintomático - Linfoadenopatia persistente generalizada, mas sem critérios para estadio II, III, ou IV.	- Perda de peso inexplicada e moderada (< 10% do peso corporal total) - Infecções recorrentes das vias respiratórias superiores (episódio actual +1 ou mais nos últimos 6 meses) - Herpes Zóster - Queilite angular - Ulcerações orais recorrentes (dois ou mais episódios em 6 meses) - Erupção papulo-pruriginosa (Prurigo) - Dermatite seborreica - Infecções fúngicas do leito ungueal	- Perda de peso >10% do peso corporal - Diarreia crónica há mais de um mês - Febre intermitente ou não explicada há mais de um mês - Candidíase oral - Leucoplasia oral pilosa - Tuberculose pulmonar actual ou nos últimos dois anos (para Moçambique) - Infecções bacterianas severas (piomiosistes, abscessos, pneumonias, etc.) - Gengivite aguda ulcerativa necrotizante ou periodontite necrotizante - Anemia inexplicada (< 8 g/dl), neutropenia (< 0,5 x 10⁹/litro) ou plaquetopenia crónica (< 50 x 10⁹/litro) por mais de 1 mês	- Síndrome de Caquexia - Pneumonia por <i>Pneumocystis jirovecii</i> - Pneumonia bacteriana severa e recorrente - Infecção crónica por <u>herpes simplex</u> (oro labial, genital ou ano rectal) de > 1 mês ou infecção visceral de qualquer duração - Toxoplasmose do SNC - Demência/encefalopatia por HIV - Sarcoma de Kaposi - Citomegalovirose - Encefalopatia por HIV - Micobacteriose atípica - Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva - Isosporiose crónica - Micose disseminada (coccidiomicose, histoplasmose, peniciliose) - Bacteriemia recorrente por <i>Salmonella</i> não typhi - Carcinoma invasivo do colo do útero - Leishmaniose visceral - Nefropatia associada ao HIV - Cardiomiopatia associada ao HIV - Candidíase esofágica - Tuberculose extrapulmonar - Herpes simplex mais de um mês ou visceral - Fístula rectovaginal

Classificação dos Estádios Clínicos da OMS – Resumo

¹ Fonte: Adaptação TARV - Formação para Técnicos de Medicina Junho 2006