

Tabela 2: Contra-indicações clínicas para iniciar o TARV

Contra-indicação	Explicação	Conduta
Doença hepática ou renal	Pode ser preciso reduzir a dose do anti-retroviral ou mudar para 2ª linha para evitar reacções adversas.	Referir ao médico para avaliação
Início de Cotrimoxazol há menos de duas semanas	As reacções adversas ao Cotrimoxazol são parecidas às reacções adversas a Nevirapina e Efavirenz. Se iniciamos o TARV e Cotrimoxazol em simultâneo, corremos o risco de não poder identificar o fármaco que provocou a reacção (Foi o CTZ, ou foi a Nevirapina?)	Esperar duas a quatro semanas depois de iniciar Cotrimoxazol antes de iniciar o TARV.
Infecção oportunista (ou sinais ou sintomas de infecção oportunista) ainda não tratada ou estabilizada	O doente que inicia o TARV antes de estabilizar uma infecção oportunista importante (por exemplo, tuberculose) pode piorar e/ou morrer por causa do síndrome de imuno-reconstituição (SIR – veja unidade de SIR).	Investigar qualquer sinal e sintoma de IO (ou TB) antes de iniciar o TARV.
		Iniciar o tratamento para IO ou TB antes de iniciar o TARV. Estabilizar o doente com IO antes de iniciar o TARV (por exemplo, esperar até o fim da fase intensiva de tratamento para TB; (veja unidade TB/HIV)