

Reações adversas aos fármacos para profilaxia de IO (Cotrimoxazol e Dapsona)

Fármaco	Reações adversas comuns e/ou importantes	História médica: perguntas	Exame físico, exames laboratoriais	Tratamento, outros comentários
Cotrimoxazol	Erupção cutânea Leve (erupção maculopapular limitada e seca)	Prurido, erupção cutânea	Temperatura Examine pele, boca, olhos; procure erupção cutânea (com ou sem vesículas e/ou lesões da mucosa).	Se prurido ou erupção cutânea sem febre, sem lesões da mucosa, sem vesículas (sem lesões húmidas): Continuar tratamento, tratar prurido com anti-histamínicos, re-avaliar na próxima consulta.
	Grave (síndrome Stevens-Johnson). Pode-se associar a toxicidade hepática.			Se erupção associada com febre, vesículas (lesões húmidas), lesões da mucosa, ou síndrome Stevens-Johnson, suspender todos os anti-retrovirais e consultar médico.
	Citopenias	Fadiga, dispneia com exercício (clínica de anemia)	Procure palidez, dispneia, taquicardia. Lab: solicite hemograma	Anemia, neutropenia (depende do grau): veja tabela de reações adversas de laboratório.
	Hepatotoxicidade: -Leve (elevação pequena e assintomática das transaminases) - Grave (falência hepática fatal)	Sintomas de hepatite: náuseas, vômitos, fadiga, mal-estar, dor abdominal, icterícia, febre, confusão (se grave).	Exame físico: Procure icterícia. Examine abdómen; procure dor e hepatomegalia. Lab: transaminases	Hepatotoxicidade: Grau 1 e 2; Controlar Grau 3 e 4: suspender Nevirapina
	Sintomas gastrointestinais (vômitos, náuseas)		Lab: solicitar transaminases (poderia ser hepatite)	Náuseas, vômitos: tratamento sintomático (metoclopramida). Se persistente pode requerir retirada (Consultar com o médico)
Dapsona	Erupção cutânea, prurido	Erupção cutânea, prurido	Temperatura Examine pele, boca, olhos; procure erupção cutânea (com ou sem vesículas e/ou lesões da mucosa).	Se prurido ou erupção cutânea sem febre, sem lesões da mucosa, sem vesículas (sem lesões húmidas): Continuar tratamento, tratar prurido com anti-histamínicos, re-avaliar na próxima consulta. Se erupção associada com febre, vesículas (lesões húmidas), lesões da mucosa, ou síndrome Stevens-Johnson, suspender todos os anti-retrovirais e consultar médico.
	Anemia hemolítica, neutropenia	Fadiga, dispneia com exercício (clínica de anemia)	Citopenias: Procure palidez, dispneia, taquicardia, petéquias Lab: solicite hemograma, bilirrubina	Anemia, neutropenia (depende do grau): veja tabela de reações adversas de laboratório.
	Hepatite, elevação de transaminases (pouco comum)	Sintomas de hepatite: náuseas, vômitos, fadiga, mal-estar, dor abdominal, icterícia, febre, confusão (se grave).	Exame físico: Procure icterícia. Examine abdómen; procure dor e hepatomegalia. Lab: transaminases	Hepatotoxicidade: Grau 1 e 2; Controlar Grau 3 e 4: suspender Nevirapina

