

Medicamentos para TB

Exemplos	Reaccoes adversas	Historia medica	Exame fisico, Exames laboratoriais	Tratamento
Isoniazida (Fase intensiva, fase de manutenção)	Hepatite	Sintomas de hepatite: náuseas, vômitos, fadiga, mal-estar, dor abdominal, icterícia, febre, confusão (se grave).	Examine abdómen; procure dor e hepatomegalia. Procure ictericia Lab: Peca transaminases , bilirrubina	Hepatotoxicidade: Grau 1 e 2; Controlar Grau 3 e 4: suspender Nevirapina
	Neuropatia periferica	Dormência, dor, ardor, ou formigueliro em ambos os pés.	Exame fisico: Se sintomas de neuropatia periférica: procure dormência ou formigueliro nos pés e tornozelos, avalie reflexos no tornozelo (podem ser diminuídos ou ausentes)	Asocie piridoxina (complexo B). Consulte com medico
Rifampicina (Fase intensiva, fase de manutenção)	Hepatite	Sintomas de hepatite: náuseas, vômitos, fadiga, mal-estar, dor abdominal, icterícia, febre, confusão (se grave).	Examine abdómen; procure dor e hepatomegalia. Procure ictericia Lab: Peca transaminases, bilirrubina	Hepatotoxicidade: Grau 1 e 2; Controlar Grau 3 e 4: suspender Nevirapina
	Erupção cutânea	Erupção cutânea	Erupção cutânea: Exame dermatológico e da boca	Erupção cutânea: Se prurigo, antihistaminicos. Se a erupção não desaparece espontaneamente, com o medico
	Trombocitopenia	Petéquia	Procure petequias Lab: solicite hemograma	Depende do grau: veja tabela de reaccoes adversas de laboratorio.
Pirazinamida (fase intensiva)	Hepatite	Sintomas de hepatite: náuseas, vômitos, fadiga, mal-estar, dor abdominal, icterícia, febre, confusão (se grave).	Examine abdómen; procure dor e hepatomegalia. Procure ictericia Lab: Peca transaminases, bilirrubina	Hepatotoxicidade: Grau 1 e 2; Controlar Grau 3 e 4: suspender Nevirapina
Etambutol (fase intensiva)	Problemas oculares	Perda da vista, perda da capacidade de identificar cores	Avaliação da acuidade visual e capacidade de diferenciar verde e vermelho	Consulte com medico

