

	Opção A	Opção B+ " TARV para eliminar a transmissão vertical ou TARV Universal"
Mãe	<p>CD4 >350</p> <p>AZT – 14 sem. IG</p> <p>NVPdu – entregue as 14sem IG para tomar no início do trabalho de parto</p> <p>AZT +3TC-trabalho de parto, ate 7 dias após o parto</p> <hr/> <p>CD4 <350</p> <p>TARV independentemente da idade gestacional (assim que diagnosticada HIV+), continuar para toda a vida</p>	<p>TARV: início assim que diagnosticada HIV + durante a gravidez, continuar para toda a vida</p> <p>Independente do CD4</p>
Criança	<p>Mãe em profilaxia</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Se aleitamento materno: NVP diária (2mg/kg/dia) desde o nascimento até 1 semana após ter terminado toda e qualquer exposição ao leite materno • Se aleitamento artificial: NVP diária (2mg/kg/dia) desde o nascimento até 6 semanas de vida <hr/> <p>Mãe em TARV</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Se aleitamento materno: NVP diária (2mg/kg/dia) desde o nascimento até 6 semanas de vida • Se aleitamento artificial: NVP diária (2mg/kg/dia) desde o nascimento até 6 semanas de vida 	<ul style="list-style-type: none"> • Se aleitamento materno: AZT 2x/dia desde o nascimento até 6 semanas de vida • Se aleitamento artificial: AZT 2x/dia (2mg/kg/dia) desde o nascimento até 6 semanas de vida